



JIME – BLACK ORGANIC

Enmienda Orgánica

NRO REGISTRO

F-2025-3552

INFORMACIÓN GENERAL

Titular de Registro	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA JIMENEZ ROMERO JIMEAGROS S.A.
Fabricante	Jiangxi Green Top Biological Technology Co., Ltd. – Qingdao, China
Registro Agrocalidad	F-2025-3552
Contenido Neto	1 kg – 5 kg – 25 kg – 50 kg

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico / Apariencia	Sólido granulado (1 – 3 mm)
Valor de pH	10.5
Densidad	1.00 g/ml
Solubilidad en agua	300 g/L

COMPOSICIÓN GARANTIZADA DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA

Componente	Concentración
Materia Orgánica	75.00 %
Ácido Húmico	50.00 %

Enmienda orgánica de alta concentración formulada a partir de leonardita de alta calidad con Materia Orgánica (75.00 %) y Ácido Húmico (50.00 %). Mejora la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), estimula la actividad de la microbiota edáfica beneficiosa y optimiza la disponibilidad de nutrientes, la retención hídrica y el desarrollo radicular. Indicado para el acondicionamiento y rehabilitación de suelos con bajo contenido de materia orgánica o estructura degradada.

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIS

Cultivo	Dosis	Época aplicación	Forma de Aplicación
Banano (Musa acuminata) Cacao (Theobroma cacao) Café (Coffea arabica) Frutales	25 - 50 kg/Ha	Todas las etapas	EDÁFICA - 6 veces al año en mezcla con fertilizantes
Papaya (Carica papaya) Piña (Ananas comosus)	10 - 25 kg/Ha	Todas las etapas	EDÁFICA - 2 a 4 veces al año en mezcla con fertilizantes
Arroz (Oryza sativa) Maíz (Zea mays) Soya (Glycine max) Sandía (Citrullus lanatus) Melón (Cucumis melo)	5 - 15 kg/Ha	Desarrollo, Vegetativo y Prefloración	Edáfica en mezcla con fertilizantes
Tomate (Solanum lycopersicum) Pimiento (Capsicum annuum) Pepino (Cucumis sativus) Papa (Solanum tuberosum)	5 - 15 kg/Ha	Ciclo productivo	Edáfica en mezcla con fertilizantes

GARANTÍAS DE CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Cumple con los límites máximos permitidos de metales pesados (Arsénico, Cadmio, Cromo Hexavalente, Mercurio, Níquel y Plomo), conforme a análisis de laboratorio acreditado.

Compatibilidad y almacenamiento: No presenta incompatibilidad con otros productos de uso agrícola. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a escala antes de aplicar en campo. Conservar en envase original herméticamente cerrado, en lugar fresco (5–35 °C), seco y alejado de niños y animales.